

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE
BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, ROUTE DE LA FORET - BIARD - 86 000 POITIERS TEL (49) 58 39 02

ISSN 0294-4650

DLP 30 - 9 - 82044755



Charente

BULLETIN N° 5 du 29 SEPTEMBRE 1982

Préparez la prochaine campagne de BLÉ

Au moment de l'implantation des blés d'hiver, les choix de variétés, date de semis, densité de semis, ont des conséquences sur l'état sanitaire futur des cultures. Il vous faut connaître ces risques pour choisir en connaissance de cause votre système de culture.

CHOIX de la DATE de SEMIS

Les essais réalisés depuis plusieurs années dans la région montrent qu'il est intéressant de faire des semis relativement précoces pour permettre une bonne implantation des blés avant l'hiver. Mais ce choix augmente nettement les risques de dégâts pour l'ensemble des maladies des céréales. Le tableau suivant donne des résultats d'observation dans le réseau d'observation des Céréales en 1982, dans la région Poitou-Charentes :

	% de parcelles menacées par :			
	le piétin-verse (le 29.3)	la septoriose (le 13.4)	l'oïdium (le 13.4)	la rouille brune (le 13.4)
Parcelles semées du 20 au 31 Octobre	23 %	10 %	20 %	20 %
Parcelles semées du 1er au 15 Novembre	4 %	0 %	0 %	0 %

L'année 1982 aura également montré les dégâts que peuvent provoquer les pucerons à l'automne (jaunisse nanisante). Et si de tels dégâts sont peu probables en 1982-83 sur des semis de Novembre, les semis de fin Octobre seront encore à surveiller.

En somme, les semis précoces, qui permettent d'espérer un meilleur potentiel de rendement, demandent une surveillance toute particulière, et conduisent à des traitements plus fréquents pour préserver ce potentiel. Pour beaucoup d'agriculteurs, la période du 25 Octobre au 8-10 Novembre est certainement un bon compromis.

P. 3

CHOIX des DENSITES de SEMIS

Les fortes densités de végétation, ainsi que l'excès d'azote, favorisent le développement des maladies. L'augmentation des densités de semis n'est nécessaire qu'en semis tardifs pour compenser un tallage plus faible.

CHOIX de la VARIETE

Il faut savoir que selon les variétés, les maladies à surveiller seront très différentes. Par le moyen de ce bulletin Blé plus, nous vous guiderons dans ce sens au cours de la prochaine campagne (évolution des sensibilités, particularités locales).

A titre d'exemple, à la notation du 20 Avril 1982, le réseau Céréales donnait la situation suivante dans les Charentes.

	Variétés Talent, Capitole, Cocagne	Variétés Top et Hardi
% parcelles touchées par la rouille brune sur les feuilles supérieures	36 %	6 %

Pas de traitements fongicides ou insecticides systématiques

Les essais réalisés depuis trois ans dans la région Poitou-Charentes par les Chambres d'Agriculture et le Service de la Protection des Végétaux montrent bien tout l'intérêt qu'il y a à raisonner les traitements;

	Gain moyen de rendement par deux traitements fongicides	% de cas où les trai- tements étaient renta- bles (écart de plus de 5 qx/ha)
1980 (26 essais)	+ 3,2 qx.	19 %
1981 (18 essais)	+ 9,8 qx.	72 %
1982 (21 essais)	+ 2,4 qx.	14 %

- Visitez fréquemment vos parcelles
- Tenez-vous informés des risques par les Avertissements Agricoles
- N'hésitez pas à consulter votre Conseiller Agricole
- Décidez des traitements en fonction de votre situation particulière.

Si vous souhaitez être renseignés plus régulièrement des problèmes sanitaires des Céréales, vous pouvez vous abonner directement à l'édition Grandes Cultures des Avertissements Agricoles. Les modalités et tarif seront diffusés avec le prochain bulletin.

Imprimé à la Station le 29 Septembre 1982

Précédente Note : N° 4 du 3.6.82